

Vyhodnocovanie hladiny sedácie u dieťaťa

<u>Motorická odpoveď</u>	<i>žiadna</i>	<i>spontánna pri bolesti</i>	<i>spontánne pohyby končatín</i>	<i>spontánny pohyb celého tela</i>	<i>výrazný motorický nepokoj</i>
	1	2	3	4	5
<u>Výraz tváre</u>	<i>žiadna reakcia</i>	<i>grimasovanie pri bolesti</i>	<i>plač iba pri manipulácii, rýchlo prestane</i>	<i>plač bez zrejmého dôvodu, dá sa utíšiť</i>	<i>neútišiteľný plač</i>
	1	2	3	4	5
<u>Oči</u>	<i>stále zavreté</i>	<i>otvára oči pri bolestivých podnetoch</i>	<i>otvára oči pri manipulácii, rýchlo zaspáva</i>	<i>spontánne otvára oči, potom zaspí</i>	<i>spontánne otvára oči, je hore</i>
	1	2	3	4	5
<u>Dýchanie s ventilátorom</u>			<i>bez spontánnej dychovej aktivity na ventilátore</i>	<i>spontánne dychy na ventilátore</i>	<i>netoleruje ventilátor</i>
			3	4	5
<u>Odpoveď na odsávanie</u>		<i>žiadna</i>	<i>iba grimasovanie, bez pohybu končatín</i>	<i>slabý kašeľ, alebo napínanie</i>	<i>bráni sa odsávaniu, výrazne kaše</i>
		2	3	4	5

Intubovaný pacient

8 – veľmi hlboká sedácia
 10 - hlboká sedácia
 12 - trochu hlbšia sedácia
 15 - dostatočná sedácia
 19 - trochu slabšia sedácia
 22 - slabá sedácia
 24 – nedostatočná sedácia

Neintubovaný pacient

3 - hlboká sedácia
 6 - silnejšia sedácia
 9 – dostatočná sedácia
 12 – slabá sedácia
 15 – nedostatočná sedácia