

I. DIAGNOSTIKA

INDIKÁCIE NA VYŠETRENIE AMATOXÍNOV (ATO) U SUSP. AI

Amanita phalloides



A



B



C



1. Ak pacient uvádza, že nazbieral a **zjedol**:
 - A) **PLÁVKU**
 - B) **ŠAMPIŇON, PEČIARKU**
 - C) **BEDĽU**
2. Ak je **interval** od požitia húb po prvé príznaky **dlhší ako 4 hodiny**.
3. Ak je v príznakoch nielen vracanie, ale hlavne **HNAČKA**.

JE POTREBNÉ VYŠETRIŤ MOČ NA AMATOXÍNY !!!

- ▶ Doniesť min. **2 ml moču** na Skriningové centrum novorodencov SR alebo na KPAIM (po 15 hod.).
- ▶ **Odobrať vzorku** čím skôr – **pred nasadením liečby** (po 47 hod. od požitia a po TH je výsledok neistý).

POZNÁMKY:

1. Pri požití húb môže byť kombinácia príznakov a chýbať interval. Spravidla **nechýba A.B.C. a hnačka**.
2. Interval aj hnačka môžu mať aj zle uvarené kuraťka a masliaky chýba A.B.C. údaj – vyšetrenie netreba sledovať.
3. Pri neistote radšej diagnostika ATO. Konzultuj SCN.
4. Pri jasnej anamnéze nasadiť protokol, pri negatívnom výsledku sa th. Vysadí – najlepšie výsledky sú pri včasnom nasadení th. Platí to pre diagnostiku po pracovnej dobe.

Kontakt na vyšetrenie:

Skriningové centrum novorodencov SR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Tel, fax: 048 – 472 65 47 alebo 472 65 56 (KPAIM)
mobil: 0918 69 69 68
e-mail: scn@dfnbb.sk