

INDIKÁCIE NA VYŠETRENIE AMATOXÍNOV (ATO) U SUSP. AI

AMANITA PHALLOIDES



A



B



C



1. Ak pacient uvádza, že nazbieral a **zjedol**:
 - a) **PLÁVKU**
 - b) **ŠAMPIŇON, PEČIARKU**
 - c) **BEDĽU**
2. Ak je **interval** od požitia húb po prvé príznaky **dlhší ako 4 hodiny**.
3. Ak je v príznakoch nielen vracanie, ale hlavne **HNAČKA**.

JE POTREBNÉ VYŠETRIŤ MOČ NA AMATOXÍNY !!!

- ▶ Doniesť min. **2 ml moču** na Skríningové centrum novorodencov SR alebo na II. KPAIM (po 15:00).
- ▶ **Odobrat' vzorku** čím skôr – **pred nasadením liečby** (po 47 hod. od požitia a po TH je výsledok neistý).

POZNÁMKY:

1. Pri požití húb môže byť kombinácia príznakov a chýbať interval. Spravidla **nechýba a), b), c) a hnačka**.
2. Interval aj hnačku môžu mať aj zle uvarené kuraťka a masliaky chýba a), b), c) údaj – vyšetrenie netreba sledovať.
3. Pri neistote radšej diagnostika ATO. Konzultuj SCN SR.
4. Pri jasnej anamnéze nasadiť protokol, pri negatívnom výsledku sa th. vysadí – najlepšie výsledky sú pri včasnem nasadení th. Platí to pre diagnostiku po pracovnej dobe.

KONTAKT:

Skríningové centrum novorodencov SR

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Tel: 048-3265 802 SCN SR (07:00 – 15:00)

048-3265 230 II. KPAIM SZU (24/7)

mobil: 0918 69 69 68

e-mail: scn@dfnbb.sk